

Ważne informacje – nie wyrzucać!

# **Agolek**

**w leczeniu dużych epizodów depresyjnych  
u dorosłych**

**Broszura dla Pacjenta**

Agolek jest lekiem przeciwdepresyjnym, który pomaga leczyć depresję.

Aby zoptymalizować leczenie, należy przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących leczenia lekiem Agolek (dawka, czas trwania terapii, ustalenie terminów wizyt, ocena badań krwi).

## Zalecenia, jak unikać występowania działań niepożądanych dotyczących wątroby

**Agolek może powodować działania niepożądane, które mogą dotyczyć zmian w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby.**

**Ta broszura zawiera zalecenia:**

- jak unikać występowania działań niepożądanych dotyczących wątroby**
- poradę, co należy zrobić, jeśli podczas leczenia lekiem Agolek wystąpią tego typu działania niepożądane.**

Należy poprosić lekarza o udzielenie dalszych informacji.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, należy zapoznać się z ulotką leku Agolek załączoną do opakowania.

### *Zgłaszanie działań niepożądanych*

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można również zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

## Co zrobić przed przyjęciem leku Agolek

**Jeśli pacjent wie, że jego wątroba nie pracuje prawidłowo, powinien powiedzieć o tym lekarzowi: w takim przypadku nie należy przyjmować leku Agolek.**

Mogą istnieć **inne przyczyny, z powodu których lek Agolek nie jest odpowiedni dla pacjenta**

Proszę zwrócić się po poradę do lekarza w następujących sytuacjach:

- jeśli pacjent kiedykolwiek miał zaburzenia czynności wątroby,
- jeśli pacjent jest otyły lub ma nadwagę,
- jeśli pacjent ma cukrzycę,
- jeśli pacjent spożywa alkohol,
- jeśli pacjent przyjmuje inne leki (o których wiadomo, że działają na wątrobę).

## Co należy zrobić, aby podczas leczenia uniknąć zaburzeń czynności wątroby?

**➔ Należy regularnie wykonywać badania krwi**

### Dlaczego?

**Przed rozpoczęciem leczenia** lekarz powinien sprawdzić, czy wątroba pacjenta pracuje prawidłowo. Wykażą to zalecone przez lekarza **badania krwi** i lekarz zdecyduje, czy Agolek jest odpowiednim lekiem dla pacjenta.

Podczas leczenia lekiem Agolek u niektórych pacjentów może się zwiększyć aktywność enzymów wątrobowych we krwi. Aktywność tych enzymów wskazuje na prawidłową lub nieprawidłową czynność wątroby oraz jest istotna dla lekarza do monitorowania leczenia.

## Kiedy?

	Przed rozpoczęciem leczenia lub zwiększeniem dawki	Po około 3 tygodniach	Po około 6 tygodniach	Po około 3 miesiącach	Po około 6 miesiącach
Badania krwi	✓	✓	✓	✓	✓

**Badania należy ponownie przeprowadzić, gdy lekarz zwiększy dawkę do 50 mg.**

**Należy pamiętać, aby zabrać ze sobą na wizytę do lekarza niniejszą broszurę.**

Jeśli pacjent dowie się, że podczas leczenia zwiększyła się aktywność enzymów wątrobowych we krwi, należy natychmiast poinformować o tym lekarza.

**Należy zachować czujność odnośnie objawów zaburzenia czynności wątroby**

Jeśli pacjent zaobserwuje którykolwiek z następujących objawów świadczących o tym, że wątroba może pracować nieprawidłowo:

- zażółcenie skóry lub oczu
- ciemno zabarwiony moczu
- jasny stolec
- ból w prawej górnej części brzucha
- nietypowe zmęczenie (zwłaszcza związane z innymi objawami wymienionymi powyżej)

**➔ Należy natychmiast zwrócić się po poradę do lekarza, który może zalecić przerwanie przyjmowania leku Agolek.**

# ROZKŁAD PLANOWANYCH BADAŃ KRWI

## NALEŻY PAMIĘTAĆ

Ważne jest, aby podczas przyjmowania leku Agolek regularnie wykonywać badania krwi. Poniższa tabela pomoże pamiętać o terminach badań krwi.

	Data
<b>Agolek 25 mg – data pierwszego przyjęcia leku</b>	
Badania poziomów enzymów wątrobowych we krwi	
Data pierwszego badania ( <i>na początku</i> )	
Data drugiego badania ( <i>po około 3 tygodniach</i> )	
Data trzeciego badania ( <i>po około 6 tygodniach</i> )	
Data czwartego badania ( <i>po około 3 miesiącach</i> )	
Data piątego badania ( <i>po około 6 miesiącach</i> )	

	Data
<b>Zwiększenie dawki do 50 mg – data pierwszego przyjęcia leku</b>	
Badania poziomów enzymów wątrobowych we krwi	
Data pierwszego badania ( <i>na początku</i> )	
Data drugiego badania ( <i>po około 3 tygodniach</i> )	
Data trzeciego badania ( <i>po około 6 tygodniach</i> )	
Data czwartego badania ( <i>po około 3 miesiącach</i> )	
Data piątego badania ( <i>po około 6 miesiącach</i> )	

Lekarz może zdecydować, że należy przeprowadzić dalsze badania krwi.

**Należy pamiętać, aby w przypadku wizyty u lekarza zabrać tę broszurę ze sobą.**